

Prof. Dr. Carl Schmidt
188

Zur

Mechanik des Magens beim Brechacte.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

einer Hochverordneten medicinischen Facultät der Kaiserl.
Universität zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Alfred Frantzen.

Ordentliche Opponenten:

Priv.-Doc. Dr. Th. v. Openchowski. — Prof. Dr. R. Kobert. — Prof. Dr. M. Runge.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1887.

Sam: Montag 18 Mai 12 1/2
30

Zur feierlichen
DOCTOR-PROMOTION

des Herrn

Alfred Frantzen,

welche

Montag, den 18. Mai 1887, 12 Uhr Mittags
im grossen Hörsaale der Kaiserlichen Universität
stattfinden wird,

laden ergebenst ein

Dorpat,
im Mai 1887.

*Decan und Mitglieder
der medicinischen Facultät.*

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät

Referent: Prof. Dr. A. Schmidt.

Dorpat den 5. Mai 1887.

Nr. 136.

Decan: Raehlmann.

Meinen Eltern

IN LIEBE UND DANKBARKEIT

gewidmet.

Bei Veröffentlichung dieser Blätter spreche ich allen meinen Lehrern an hiesiger Universität meinen aufrichtigsten Dank aus für die wissenschaftliche Anregung, welche sie mir während meiner Studienzzeit geboten.

Prof. E. G. von Wahl sei es mir gestattet insbesondere zu danken für die Theilnahme, die er mir während meines hiesigen Aufenthaltes bewiesen.

Eine angenehme Pflicht ist es mir ferner Herrn Priv. Doc. Th. v. Openchowski zu danken, dem ich vorliegendes Thema verdanke und der mir in freundlicher Weise bei der Bearbeitung desselben zur Seite stand.

Herr Prof. A. Schmidt hatte die Freundlichkeit, mir die Hilfsmittel des physiologischen Instituts zur Verfügung zu stellen, wofür ich ihm hiermit meinen Dank ausspreche.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Historisches.

a. Das Verhalten des Magens beim Brechacte.

Die Lehre vom Erbrechen fällt in die älteste Zeit. Schon Galen entwickelt eine Theorie desselben. Er theilte dem Magen in Bezug auf seine Functionen 4 facultates zu: die attractrix, retentrix, alteratrix und die expultrix. Letztere sollte die Aufgabe haben, wie schon der Name sagt, den Mageninhalt durch eine der beiden Oeffnungen zu treiben. Ob nun der Mageninhalt durch den Pylorus oder die Cardia austritt, sollte nach ihm davon abhängen, nach welcher Oeffnung hin der Reiz gerichtet sei. Er betrachtete somit das Erbrechen, als einzig und allein durch die Contraction des Magens zu Stande kommend. Der gleichen Ansicht huldigten auch Avicenna, Gordonius, Cardanus, Bauhinus etc. wie sie genauer bei Knaut citirt sind.

Diese Ansicht wurde von Bayle¹⁾ 1681 und Chirac²⁾ 1700 erschüttert, indem beide durch ihre Beobachtungen an Hunden zum Schlusse kamen, daß der Magen beim Brechacte sich völlig passiv verhalte und das Erbrechen nur durch Contraction der Bauchmuskulatur, combinirt mit einem Herabsteigen des Zwerchfells zu Stande käme.

Gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts veröffentlichte Benjamin Schwartz³⁾ seine Beobachtungen über das Erbrechen. Er legte den Magen frei, brachte ihn außer

Continuität mit der Bauchpresse und constatirte, daß nach Darreichung eines Brechmittels kein Erbrechen eintrete. Er beobachtete auch als Erster Magenbewegungen während des Brechactes und zwar am pylorischen Theile des Magens, doch schreibt er ihnen nur insofern Bedeutung zu, als sie dem Speisebrei den Durchtritt in's Duodenum verwehren.

Um dieselbe Zeit stellte Haller⁴⁾ die Antiperistaltik als punctum saliens des Erbrechens auf und erst in seinen späteren Arbeiten giebt er zu, daß die Bauchpresse mitwirke, falls die Magenthätigkeit allein nicht ausreiche.

Im Jahre 1813 trat Magendie⁵⁾ mit seinen Untersuchungen an die Oeffentlichkeit. Er beobachtete während des Erbrechens den Magen durch eine Oeffnung in den Bauchdecken, desgleichen palpirt er auch den Magen, konnte aber dabei keinerlei Bewegungen desselben wahrnehmen, als nur eine durch vorhergegangenes häufiges Verschlucken von Luft hervorgerufene passive Dilatation desselben. Er stellte auch Durchschneidungsversuche an, indem er einestheils die NN phrenici durchschnitt und dabei doch, wenn auch erschwert, Erbrechen eintreten sah, anderseits die Wirkung der Bauchmuskeln aufhob und die NN phrenici intact ließ. Auch hierdurch wurde der Brechact nicht aufgehoben. Das Erbrechen blieb erst aus, wenn er sowohl das Zwerchfell als auch die Bauchmuskeln außer Function setzte.

Weit schlagender jedoch als diese Beobachtung erschien Magendie's Experiment mit der Schweinsblase. Er extirpirte den ganzen Magen und sah, nachdem er ihn durch eine Schweinsblase ersetzt, bei Darreichung des Brechmittels doch Erbrechen eintreten. Das erregte großes Aufsehen und gab Veranlassung zu einem heftigen Streite, aus dem namentlich der Name Tantini⁶⁾ hervorzuheben ist. Dieser Forscher machte Magendie auf einen Fehler bei seinem

Experiment aufmerksam, welcher darin bestand, daß mit dem Magen auch die Cardia extirpirt worden. Läßt man die Cardia am Oesophagus und entfernt den Magen unterhalb derselben, so bleibe das Erbrechen stets aus. Eine Erklärung für diese Thatfache konnte jedoch T a n t i n i nicht geben.

R ü h l e ⁷⁾ machte dieselben Beobachtungen wie S c h w a r t z und constatirte außerdem noch ein während des Erbrechens jedesmaliges Indiehöhesteigen der Cardia, was er auf eine Contraction der Längsfasern des Oesophagus zurückführt. Da er nun die von S c h w a r t z beobachteten Bewegungen des Magens für inconstant und infolge dessen nicht für unentbehrlich ansieht, das Ansteigen der Cardia aber mehr auf Rechnung des Oesophagus als des Magens schiebt, so ertheilt er dem Magen eine passive Rolle beim Brechacte. Die kurz vorher von B u d g e ⁸⁾ gemachte Angabe über einen Pylorusstoß während des Erbrechens hat R ü h l e nicht beobachten können. Er stellte ferner noch mittelst einer in den Magen eingeführten und mit einem Manometer verbundenen Röhre Versuche in Bezug auf die Druckschwankungen des Mageninnern während des Erbrechens an, und fand keine solchen. S c h i f f ⁹⁾, ein namhafter Forscher, stellte seine Versuche an Hunden an, denen er die Bauchhöhle durch einen Kreuzschnitt eröffnete und die Leber so fixirte, daß ihm der ganze Magen frei zu Tage lag. Bei Einverleibung eines Emeticum constatirte er Bewegungen peristaltischer Natur, und wenn solche schon vorher vorhanden gewesen, eine Verstärkung derselben. Nach ihm treten die stärksten Bewegungen im rechten Theil des Magens auf und haben einen vermiculären Character. Zuweilen hat er auch eine Bewegung des Pylorus von rechts nach links wahrgenommen, die jedoch keineswegs constant war

und nicht im Entferntesten an einen Stofs (Budge) erinnerte, da sie langsam und sehr schwach erfolgte. Er kommt zum Schluss, daß diese Bewegungen nicht als ein directes Adjuvans fürs Erbrechen anzusehen seien, sondern nur indirect dasselbe erleichtern, insofern sie einen stärkeren Verschluss des Pylorus bewirken. Dieser Verschluss begünstige die durch Verschlucken von Luft entstehende Aufblähung des Magens, welche ihrerseits der Bauchpresse die Arbeit erleichtere. Um nun über diesen Punkt ins Klare zu kommen, brachte er seinen Versuchsobjecten gleich unterhalb des Pylorus im Duodenum eine Fistel bei und constatirte, daß bei geringer Füllung des Magens mit festen Substanzen der Pylorus nichts durchliese. Gab er jedoch einige Stunden nach der letzten Mahlzeit vor dem Experimente etwas dickflüssigen Reis und hierauf das Brechmittel, so fand er stets kleine Quantitäten des ersteren, sei es im Duodenum, sei es an den Rändern der Fistel. Bei starker Füllung des Magens verhielt sich ein und dasselbe Thier an verschiedenen Tagen verschieden. Einmal liefs der Pylorus kleine Quantitäten passiren, das andere Mal trat nichts aus dem Magen in den Darm über.

Wenn Schiff die Bewegungen des Magens auch nicht als direct das Erbrechen auslösende ansieht, so gesteht er die Passivität des Magens auch nicht zu. Durch Analyse einiger pathologischer Fälle, bei welchen nach Darreichung eines Brechmittels kein Erbrechen eintrat, trotzdem die Bauchpresse ungestört fungirte, schlofs er, daß irgend welche Bewegungen des Magens fehlten, die dem Eintritt des Erbrechens ein Hinderniß setzten, da Brechbewegungen vorhanden waren. Er suchte dieses Hinderniß an der Cardia. Durch eine für zwei Finger passirbare Magenfistel, führte er den einen derselben durch die Cardia in den Oesophagus seines Versuchsobjectes. Hierauf applicirte er das Emeticum

und constatirte eine für den Finger deutlich wahrnehmbare Oeffnung der Cardia, die schon vor Eintritt des Erbrechens während der Nausea zu Stande kam. Den Einwand, daß diese Oeffnung der Cardia vielleicht passiv durch Druck-erhöhung im Mageninnern eintrete, widerlegt Schiff erstens durch die Bemerkung, daß sie sich schon während der Nausea einstelle, also bevor die Bauchpresse in Wirkung tritt und zweitens durch ein negatives Experiment: Er schaltete durch Zermalmung des hart unter der Cardia befindlichen Magentheiles die Längsmuskelfasern, die ja die Dilation der Cardia bewirken, aus und sah nach Darreichung eines Emeticum das Erbrechen ausbleiben. Hierdurch gab er auch die Erklärung für die seiner Zeit von Tanti⁶⁾ gemachte Beobachtung. Wie wir später sehen werden, ist diese Erscheinung durch die Arbeiten von Openchowski, Rosen, Knaut und Hlasko noch weiter geklärt worden.

Einer Kieler Dissertation von Bernhard Luettich¹⁰⁾ 1873 habe ich noch zu erwähnen, in welcher Verfasser noch auf eine gewisse Ansaugung des Mageninhaltes von seiten des Oesophagus hinweist, insofern das Erbrechen im Momente einer starken Inspiration eintrete und der negative Druck seine Wirkung auf den Oesophagus und somit indirect auch auf den Magen entfalte.

b. Innervationsverhältnisse des Magens.

Schon in älterer Zeit wurden Versuche in Bezug auf diesen Punkt angestellt, doch handelte es sich hierbei immer nur um die Vagi allein. Dabei widersprachen sich die Resultate dieser Untersuchungen, indem die einen behaupteten, daß bei Aufhebung der Leitung in den Vagis der Magen

gelähmt und feine Bewegungen gehemmt würden, die anderen völlige Integrität desselben bemerkt haben wollten.

Späterhin wurde der negativen Methode mittelst Durchschneidung die positive in Form des Reizes vorgezogen. Diese Methode wandten Budge⁸⁾, Mayer u. A. an und wiesen nach, daß der Vagus motorische Fasern für den Magen führe, da sie durch Reizung derselben Peristaltik hervorrufen konnten.

Longet³³⁾ sah diese Wirkung nur während der Verdauung eintreten und vermifste sie bei leerem Magen.

Braam-Houckgeest¹¹⁾ und Sanders¹¹⁾ wollten bei Reizung einen Unterschied zwischen rechtem und linkem Vagus constatirt wissen.

Magendie¹²⁾ und Schultze nahmen Durchschneidungen der Vagi vor, ersterer in der Brusthöhle, letzterer in der Bauchhöhle und fanden beide, daß die Verdauung ungestört von Statten ging.

Budge⁸⁾ sah nach Vagusdurchschneidung bei Darreichung eines Emeticum Erbrechen eintreten, während Bulatowitz¹³⁾ das Gegentheil behauptet und daher im Vagus den eigentlichen Brechnerven sieht.

Brachet¹⁴⁾ macht Magendie und Schultze darauf aufmerksam, daß außer den beiden sichtbaren Vagusstämmen sich noch feine Fädchen von denselben abzweigen, im lockeren Zellgewebe des Oesophagus verlaufend und bis zum Magen hin unsichtbar bleibend. Um nun den Magen völlig dem Einflusse des Vagus zu entziehen, müßten auch diese durchtrennt werden.

Schiff⁹⁾ giebt zu diesem Zwecke eine Methode an, welche nicht so eingreifend ist, wie die von Magendie proponirte und ausgeführte quere Durchtrennung des Oesophagus. Sie besteht in einer Freilegung des Oesophagus

hart unter dem Zwerchfell, worauf nach Durchtrennung der sichtbaren Nerven eine circuläre Incision bis auf die Muscularis, mit Schonung dieser, folgt. Auch er huldigt Bultowitz's¹³⁾ Ansicht in Bezug auf den Vagus, nur schreibt er ihm noch eine öffnende Fähigkeit für die Cardia zu.

Goltz¹⁵⁾ nahm an Fröschen Durchschneidungen der Vagi und Zerstörungen des Gehirns und Rückenmarks vor und löste durch diese Eingriffe starke Contractionen des Magens und Oesophagus aus. Ferner sah er nach Reizung der Haut und der Gedärme reflectorisch Magenbewegungen auftreten, die nach Vagusdurchschneidung ausblieben.

Was die Innervation des Magens von seiten des Sympathicus anbelangt, so standen sich auch hier die Meinungen der Autoren gegenüber.

Valentin¹⁶⁾ sah nach Reizung des Gangl. coeliacum und beider Sympathici Bewegungen des Magens auftreten.

J. Müller¹⁷⁾ und Oehl¹⁸⁾ leugnen jeden Einfluss des Sympathicus und des Pl. solaris auf den Magen.

Longet³³⁾ dagegen glaubt, die oberflächlichen vermiculären Bewegungen, die man nach Vagusdurchschneidung beobachtet, dem Sympathicus zuschreiben zu müssen.

Schiff⁹⁾ und Goltz¹⁵⁾ sahen gleichfalls Bewegungen des Magens nach Reizung des Pl. coeliacus.

In neuerer Zeit hat diese Frage grössere Fortschritte gemacht und präcisere Resultate gegeben.

So beobachtete Greve¹⁹⁾, dass das centrale Erbrechen nach Apomorphin in Abhängigkeit vom Rückenmark stehe, indem Durchtrennung desselben von oben bis herab zum VI. Brustwirbel, gleich viel in welchem Querschnitt, das Erbrechen unmöglich mache.

Von Openchowfki und seinen Schülern wurde dieses Gebiet von Neuem in Angriff genommen und die nervösen

Vorrichtungen des Magens mit genaueren Methoden und detaillirt studirt.

Th. Openchowfki²⁰⁾ brachte Klarheit in die Innervationsverhältnisse der Cardia, indem er den N. dilatator und die NN. constrictores cardiae entdeckte.

Rosen²¹⁾ wies für Lobelin dieselben Verhältnisse nach, wie Greve für Apomorphin.

Knaut²²⁾ fand speciellere Beziehungen des Rückenmarks zur Cardia. Er wies im oberen Theile desselben öffnende, im unteren schließende Fasern für die Cardia nach. Beide Fasergattungen sind nach ihm im Brusttheil des Sympathicus enthalten.

Ofer²³⁾ (in Wien) studirte die Innervation des Pylorus an Hunden, und constatirte für den Vagus eine contrahirende Wirkung, für den Splanchnicus dagegen eine hemmende.

Dobbert²⁴⁾ fand bei Kaninchen complicirtere Verhältnisse für den Pylorus, untersuchte genau die spontanen Bewegungen desselben und beschrieb wie Openchowfki, an der Cardia, Ganglienhaufen am Pylorus, die für automatische gehalten werden müssen. Ferner wies er für Kaninchen nach, daß der obere Theil des Rückenmarks hauptsächlich öffnende Fasern, der untere contrahirende Fasern für den Pylorus enthalte. Der Vagus dagegen führt nur schließende Fasern wie beim Hunde.

Vor Kurzem hat Hlasko²⁵⁾ in den Vierhügeln die Centra für die Contraction der Cardia und der Magenwandungen und in der Verbindung des Linsenkerns mit dem nucleus caudatus den Ursprung des N. dilatator cardiae nachgewiesen.

Wie man aus der historischen Uebersicht ersehen kann, sind die Controversen in Bezug auf den Antheil des Magens am Erbrechen ungeheuer groß. Keine der angestellten Untersuchungen gab befriedigende Resultate, da vieles Unauflörlche nachblieb. Der scharfe Gegensatz der Theorien, verrieth die Mangelhaftigkeit derselben, und legte Zeugniß für die Schwierigkeiten der diesbezüglichen Untersuchungen ab. Nachdem nun *O p e n c h o w s k i* und seine Schüler einige wichtige Aufschlüsse über die nervösen Vorrichtungen des Magens gegeben, lag es nahe, die Frage über Activität und Passivität desselben beim Brechacte wieder aufzunehmen.

Von Herrn Dr. *O p e n c h o w s k i* aufgefordert habe ich diesbezügliche Untersuchungen um so bereitwilliger angestellt, als die schon von ihm und *K n a u t* ausgeführten Versuche interessante Aufschlüsse in Betreff dieser Frage zu geben versprochen.

In Nachfolgendem sind die Resultate dieser meiner Untersuchungen niedergelegt.

Meiner nicht leichten Aufgabe von vorn herein bewußt mußte ich zuerst einige Versuche, zur Controlle der von den Autoren angegebenen, normalen Magenbewegungen, anstellen. Diefem Umfande verdankt das I. Capitel vorliegender Arbeit seine Entstehung.

Capitel II enthält: Bewegungen des Magens unter der Wirkung von Brechmitteln.

Capitel III enthält: Untersuchungen über die centrale Innervation des Pylorus.

Capitel I.

Normale Bewegungen des Magens.

Ehe ich zu meinen Beobachtungen übergehe, möchte ich noch einen Blick auf die Literatur der normalen Bewegungen des Magens zurückwerfen.

Die Ersten die solche am lebenden Thiere beobachtet, waren Peyer²⁶⁾ und Wepfer²⁶⁾, zwei schweizer Autoren. Sie berichten uns ueber Bewegungen zweierlei Art, peristaltischer und antiperistaltischer Natur, die während der ganzen Zeit der Verdauung anhielten.

B. Schwartz³⁾ widerspricht auf Grund feiner Experimente an Hunden dieser Angabe, behauptet im Gegentheil, daß man diese Bewegungen nur äußerst selten zu Gesicht bekomme und zwar auch nur dann, wenn man den Magen direct reize. Sie beginnen nach ihm am Pylorus und schreiten bis zur Magenmitte fort. In sehr seltenen Fällen fahre sie an der pars cardiaca des Magens beginnen und zur Mitte fortzuschreiten.

Haller⁴⁾ und Spallanzani²⁷⁾ bestätigen die Schwartzschen Beobachtungen. Auch Magendie ist derselben Ansicht nur behauptet er, daß die Bewegungen nicht vom Pylorus sondern vom Duodenum ihren Anfang nehmen.

Beaumont²⁸⁾ stellte an einem mit einer Magenfistel behafteten Canadier seine Beobachtungen an und beschrieb einen Rundlauf der Speisen, von der Cardia längs der großen Curvatur zum Pylorus und von hier längs der kleinen Curvatur wieder zurück.

Schiff⁹⁾ bediente sich als Versuchsobjecte der verschiedensten Thiergattungen — Hunde, Katzen, Kaninchen etc. und fand folgendes: Ungefähr in der Mitte des Magens

bildet sich eine Einschnürung, die am tiefsten an der großen Curvatur. Zuweilen, namentlich bei Fröschen und Schlangen, sah er noch eine zweite Furche, welche beiden dann dem Magen ein dreikammriges Aussehen verliehen. Ausser diesen Furchen beobachtete Schiff noch vermiculäre Bewegungen, die er je nach dem Orte ihres Auftretens in drei Gruppen theilt: die des pyloren, die des Milztheiles des Magens und die des cardialen Theiles des Oesophagus. Der rechte und linke Theil des Magens sind im Stande, unabhängig von einander Bewegungen auszuführen. Was den Character der Bewegungen anbetrifft, so beschreibt auch Schiff⁹⁾ die von Magendie beobachtete, am Duodenum beginnende und zur Magenmitte fortschreitende antiperistaltische Welle. Hierbei macht er die Bemerkung, daß die Pars Pylorica sich nie in toto contrahire, sondern die Contraction stets in Wellenform aufträte. Bis zur Mitte angelangt, mache die Welle eine Pause und kehre peristaltisch zum Pylorus zurück.

Baßlinger²⁹⁾ beschrieb unter dem Namen „Cardiapuls“ eine rhythmische Zusammenziehung der Cardia und Openchowski²⁰⁾ und Dobbert²⁴⁾ besprachen späterhin genauer die normalen Functionen der Cardia und des Pylorus.

In jüngster Zeit haben Hofmeister und Schütz³⁰⁾ eine Methode zur Beobachtung der normalen Magenbewegungen erfunden, auf die ich etwas genauer eingehen muß. Sie lassen das Thier aus der Carotis verbluten, schneiden den Magen mit einem Stück des Oesophagus und Duodenum aus und hängen ihn in eine feuchte Kammer, deren Temperatur auf 37—38° constant erhalten wird. Sie sehen, nachdem der Magen längere Zeit in Ruhe verharret, sich Bewegungen an ihm einstellen, die eine gewisse Zeit mit abnehmender Intensität anhalten, um schließlich mit dem Absterben des Organs völlig aufzuhören.

Die Mängel dieser Methode liegen auf der Hand. Unwillkürlich drängt sich einem die Frage auf, ob solche Bewegungen wirklich für normal zu halten sind, oder ob sie nicht vielleicht gar postmortalen Ursprungs?

Wenn Hofmeister und Schütz auch als Beweis für die Vitalität das Erhaltensein der electricchen Erregbarkeit und den Dehnungsreflex anführen, so ist doch jedenfalls klar, daß der ausgeschnittene Magen der Ernährung bar, den normalen Verhältnissen entzogen ist. Ein anämischer Magen ist kein normaler Magen. Bereits Schiff⁹⁾ hat darauf hingewiesen, daß die Magenbewegungen eines kurz vorher getödteten Thieres in ihrem Character von der Norm abweichen und O p e n c h o w s k i und D o b b e r t²²⁾ haben postmortale Bewegungen, sowie auch anämische intra vitam graphisch dargestellt.

Die Resultate der Hofmeister-Schütz'schen Untersuchungen sind nun in Kürze folgende: Einige Ctm. von der Cardia entfernt bildet sich eine Einschnürung, von welcher aus eine Wellenbewegung beginnt, die nach rechts hin fort schreitet und einige Ctm. vor der Pars Pylorica (Antrum pyloricum) mit einer Präantralfurche endet. Hier auf tritt eine Zuschnürung des Sphincter antri ein, welcher eine Contraction der Pars Pylorica durch gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Verkürzung der Ring- und Längsmusculatur in toto folgt.

Den ganzen Vorgang bezeichnen Schütz und Hofmeister mit dem Namen Peristole und theilen ihn in zwei Phasen ein, von denen die erste die Peristaltik von der mittleren bis zur präantralen Einschnürung in sich schließt, die zweite die Contraction des Antrum pyloricum umfaßt. Außerdem beschreiben sie noch eine dritte Phase, welche antiperistaltisch erfolgt, mit einer Contraction des Pylorus

beginnend und einer solchen des Sphincter schließend. Diese haben sie aber nur bei festem Mageninhalt im Antrum pyloricum beobachten können.

Nachdem ich so eine kleine Uebersicht über die Literatur des Magens gegeben, glaube ich zur Wiedergabe meiner eigenen Untersuchungen übergehen zu können.

Da die Untersuchungen von Openchowski²⁰⁾, Knaut²²⁾, Dobbert²⁴⁾ und Hlasko²⁵⁾ vermittelft der graphischen Methode uns nur über die Functionen der einzelnen Magenabschnitte in ihrer Besonderheit Aufschluß geben, so schien es mir am Platze, durch directe Beobachtung mit dem Auge ein Gesamtbild derselben zu erhalten und gleichzeitig die Resultate dergenannten Autoren zu controlliren.

Da mir nun die Hofmeister-Schütz'sche Methode aus schon früher erörterten Gründen nicht zweckmäfsig erschien, so bediente ich mich einer anderen, die ich in Kürze schildern will:

Das Versuchsthier wurde auf dem Czermak'schen Halter befestigt, tracheotomirt und die vena jugularis ext., der Oesophagus und, wenn nöthig, auch die Vagi freigelegt. Hierauf wurde das Thier durch eine in die Vene eingeführte Canüle curarifirt und die künstliche Respiration eingeleitet. Nach eingetretener Lähmung der willkürlichen Muskeln wurde der Bauch durch einen Schnitt in der Medianlinie (linea alba) eröffnet. An diesen schlossen sich noch zwei senkrecht auf ihn stofsende Schenkel, welche die Weichtheile beider Seiten durchtrennten. Die dabei entstehende Blutung ist kaum der Erwähnung werth. Nun wurde der linke Leberlappen soweit es ging vom Zwerchfell abgelöst, mit sorgfältiger Schonung der Gefäße, damit nicht durch etwaige Zerreißungen derselben und Ekchymosenbildung der Magen in seiner Ernährung geschädigt werde. Durch den

vom Halse aus in den Oesophagus eingeführten Katheter wurde der Magen mit $\frac{1}{2}$ % warmer Kochsalzlösung mäßig gefüllt, da wie ich mich später zu überzeugen Gelegenheit hatte, eine zu starke Füllung des Magens die Bewegungen desselben beeinträchtigt.

Das so behandelte Thier wird darauf in den Wärmeapparat von Schmiedeberg gebracht, der mir durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. K o b e r t zur Disposition stand und wofür es mir an dieser Stelle gestattet sei, meinen Dank auszusprechen.

Genannter Apparat stellt einen aus Blech verfertigten, mit doppelten Wänden versehenen Kasten dar. Der zwischen beiden Wänden befindliche Raum wird mit heißem Wasser gefüllt, dessen Temperatur durch eine daruntergestellte Petroleumlampe regulirt werden kann.

Das Versuchsthier wurde auf auf den Boden ausgebreitete Watte gelagert. Vermittelt Haken, welche durch eine Schnur mit Gewichten in Verbindung standen, wurden die Bauchdecken und die Leber so fixirt, daß der Magen in all seinen Theilen frei vor Augen lag. Hierbei wurde jedesmal darauf geachtet, daß die Leber bei ihrer Fixation keine Zerrung erleide und dadurch Stauung bewirke. Auf den Boden des Apparats pflegte ich noch etwas Wasser zu gießen, damit die sich entwickelnden Dämpfe den Magen vor dem Vertrocknen schützten. Zu letztgenanntem Zwecke wurde auch der Magen von Zeit zu Zeit während der Versuchsdauer mit $\frac{1}{2}$ % warmer Kochsalzlösung beträufelt. Die Temperatur des Thieres wurde auf $37-38^{\circ}\text{C}$. constant erhalten, und konnte von einem unter die Gedärme eingeführten Thermometer abgelesen werden. Der ganze Apparat wurde durch einen Glasdeckel verschlossen, durch den man bequem feine Beobachtungen anstellen konnte.

Die Dauer der ganzen Operation beläuft sich bei einigermaßen gewandtem Operiren auf 15 bis 20 Minuten, wovon auf Eröffnung der Bauchhöhle, Füllung des Magens und Lagerung im Wärmekasten höchstens 5 Minuten kommen.

Diese Methode hat den Vortheil, daß der Magen in Verhältnisse gebracht wird, die der Norm so nah wie nur möglich stehen, er büßt seine Ernährung nicht ein und bleibt im Zusammenhang mit dem Nervensystem.

Zu meinen Untersuchungen wählte ich hauptsächlich Katzen, da kleine Hunde schwer zu beschaffen waren. Nichts desto weniger habe ich auch an einigen Hunden Versuche angestellt.

Von den an 30 Thieren angestellten Beobachtungen veröffentliche ich hier nur einen Theil der Protocolle, da die übrigen genau dieselben Resultate ergeben haben und die Wiedergabe aller 30 somit keinen Zweck hat.

Experiment I.

Eine junge Katze wird nach Curarisirung und Einleitung der künstlichen Respiration in den Wärmekasten gebracht. Temperatur des Thieres 37° C.

- II^b 30 Der Magen zeigt ganz leicht über seine Oberfläche bis zum Sphinkter antri pylori verlaufende und von der Mitte beginnende Peristaltik.
- II^b 45 Temperatur $37,8^{\circ}$ C. An der Grenze des mittleren und oberen Drittels eine quere Einschnürung, die von der kleinen Curvatur zur großen herunterläuft und an letzterer deutlicher ausgesprochen ist. Die Cardia erscheint contrahirt.
- II^b 46 Die Peristaltik sistirt. Die Mittelfurche deutlich vorhanden.
- II^b 55 Breite Oeffnung der Cardia. Die Peristaltik beginnt aufs Neue von der Mittelfurche; der über ihr gelegene Theil verhartet in Ruhe. Die Peristaltik geht deutlich auf die pars pylorica über.

- 11^b 57 Deutliches Spiel der Cardia.
 12^b 0 Die Peristaltik stark ausgeprägt mit deutlich wahrnehmbarer Contraction des Sphinkter antri pylori. Der Pylorus zeigt spontanes Spiel.
 12^b 10 Die Peristaltik abgeschwächt. Sphinkter-Contraction undeutlich.
 12^b 12 Das Spiel des Pylorus hat aufgehört, die Mittelfurche erscheint flacher.
 12^b 14 Nur die beiden unteren Drittel des Magenkörpers zeigen schwache Peristaltik, während die PP.*) sich ruhig verhält. P. und Cardia in mittlerem Contractionszustande.
 12^b 15 Nur bei genauer Befichtigung eine oberflächliche Wellenbewegung in den zwei unteren Dritteln wahrzunehmen, die Mittelfurche ganz abgeflacht.
 12^b 20 Vollkommene Ruhe.

Experiment II.

Ein junger Kater, wie oben behandelt, wird in den Wärmekasten gethan. Temp. 37,5.

- 11^b 0 Spiel der Cardia; zwischen oberem und mittlerem Drittel stark ausgeprägte Mittelfurche. Peristaltik des unteren Drittels des Mk. und der PP. Spiel des P.
 11^b 5 Ruhe.
 11^b 10 Spiel des P., Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk., verbunden mit einer spiralförmigen Drehung desselben, wobei die Spirale von unten links nach oben rechts verläuft.
 11^b 12 Sehr starke Peristaltik des unteren Drittels des Mk., das dadurch sich sehr stark ver schmälert, und der PP.
 11^b 19 Dilatation der PP. Spiralförmige Contraction der zwei unteren Drittel des Mk, die zahlreiche minimale Längsfurchen aufweisen.
 11^b 23 Der Pylorus hat sein Spiel eingestellt.
 11^b 24 Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk. und der PP. Contraction des P.
 11^b 35 PP. und P. ruhig, nur die zwei unteren Drittel des Mk. zeigen eine wogende Bewegung, indem sie sich

*) Abkürzungen: PP. = Pars Pylorica. P. = Pylorus Mk. = Magenkörper = Stück zwischen Cardia und Sphincter antri pylorici.

stellenweise in abwechselnder Contraction und Dilatation befinden, ohne daß eine peristaltische Wellenbewegung wahrzunehmen wäre.

II^h 45 Ruhe.

Experiment III.

Eine Katze, wie oben behandelt, wird in den Wärmekasten gethan. Temp. 35,8.

II^h 0 Mittelfurche nicht sehr deutlich, vertieft und flacht sich abwechselnd ab. Von ihr ausgehend Peristaltik, wobei man die Welle auch deutlich über die PP. schreiten sieht. Cardia und P. spielen.

II^h 10 Temp. 36,5. Die Bewegungen werden lebhafter und halten denselben Typus ein wie oben.

II^h 15 Die Mittelfurche sehr tief, namentlich an der Curv. major., Peristaltik stark, die Contraction des Sphinkter antri pylori nur ausnahmsweise deutlich ausgesprochen, vielmehr ist der Uebergang der Welle auf die PP. ein gleichmäßiger.

II^h 20 Starke Peristaltik, verbunden mit rotirenden (spiralförmig) Bewegungen des unteren Drittels des Mk.

II^h 22 Die Bewegungen des Mk. schwächer, starke Peristaltik der PP. Starke Pyloruscontractionen.

II^h 26 Die zwei unteren Drittel des Mk. weisen eine Bewegung auf, die zwischen Peristaltik und Antiperistaltik wechselt, alle übrigen Theile ruhig.

II^h 30 Nur schwache Peristaltik der zwei unteren Drittel.

II^h 35 In allen Theilen Ruhe.

Experiment IV.

Eine junge Katze, wie oben behandelt, wird in den Wärmekasten gebracht.

IO^h 50 Temp. 34,0 ° C. Der Magen macht nur kaum ange deutete unregelmäßige Contractionen. PP. schlaff. P. und Cardia in mittlerem Contractionszustand. Schwache Pulsation der Gefäße.

II^h 0 Temp. 35,1 ° C. Die Pulsation der Gefäße wird deutlicher. Spiel der Cardia.

II^h 2 Tief ausgesprochene Mittelfurche, über welcher der Magenkörper an der Curvatura major ein wogendes

- Spiel zeigt durch abwechselnde Dilatation und Contraction. Die zwei unteren Drittel erscheinen mehr weniger contrahirt und ruhig.
- II^b 15 Temp. 37,0°. Starke Peristaltik der PP. und des Duodenum, wogegen P. sich nur schwach contrahirt. Die zwei unteren Drittel des Mk. in rotirender Bewegung begriffen, ohne Peristaltik.
- II^b 20 Mehrere auf einander folgende Vertiefungen und Abflachungen der Mittelfurche. Peristaltik der PP. mit stärkeren P.-Contractionen.
- II^b 25 Temp. 37,7° Peristaltik der PP. wird immer stärker die zwei unteren Drittel des Mk. machen wogende Bewegungen, die mit rotirenden (spiralförmig) combinirt sind.
- II^b 33 Peristaltik der PP. schwächer, ebenso die wogenden Bewegungen der zwei unteren Drittel des Mk.
- II^b 44 Die Mittelfurche fingerbreit; der ganze übrige Theil des Magens dilatirt und ruhig bis auf die Cardia, die noch spielt.
- II^b 47 Auf's Neue stärkere wogende Bewegungen im unteren Drittel des Mk.
- II^b 48 Peristaltik der PP. ohne sichtbare Contraction des P. Spiel der Cardia hat aufgehört.
- II^b 54 Ruhe. Mittelfurche abgeflacht. PP dilatirt P. im Mitteltonus.

Experiment V.

Eine junge Katze wie oben behandelt, wird in den Wärmekasten gebracht.

- II^b 20 Temp. 37,5°. Der Magen zeigt hart unter der Cardia entsprechend den beiden Curvaturen zwei Buckel. Bewegungen sehr schwach und unregelmäßig.
- II^b 22 Spiel des Pylorus.
- II^b 26 Deutlich ausgesprochene Mittelfurche, die sich abwechselnd vertieft und abflacht. Cardia in mittlerem Contractionszustande.
- II^b 27 Das Spiel der Cardia beginnt.
- II^b 30 Schwache Peristaltik der PP.
- II^b 34 Peristaltik der zwei unteren Drittel der PP. mit deutlicher Sphinctercontraction.
- II^b 35 Stärkere Peristaltik der zwei unteren Drittel, untermischt mit rotirenden Bewegungen.

- 11^b 50 Kaum merkliche Peristaltik des Mk. PP. und P. ruhig, der Sphincter antri pylori in mäßigem Contractionszustande. Vollkommene Ruhe, die Mittelfurche nur noch kaum wahrnehmbar.

Experiment VI.

Kater wie oben behandelt, wird in den Wärmekasten gebracht.

- 10^b 43 Temp. 36,5° C Spiel des Pylorus. Mittelfurche ausgesprochen, wogende Bewegung im Bereiche des mittleren Drittels des Mk. Die übrigen Theile ruhig.
 11^b 52 Peristaltik des unteren Drittels des Mk. mit deutlicher Sphinctercontraction auf die PP. übergehend.
 10^b 54 Temp. 37,0° C. lebhafteres Spiel des P.
 10^b 58 Wird auch das mittlere Drittel von der Peristaltik ergriffen. Die Sphinctercontractionen undeutlich. Der P. hat sein Spiel eingestellt und erscheint mittelcontrahirt.
 11^b 5 Die Mittelfurche fingertief. Peristaltik stärker mit deutlichen Sphinctercontractionen.
 11^b 7 Peristaltik wieder schwächer.
 11^b 15 PP. ruhig und dilatirt, das mittlere Drittel zeigt noch oberflächliche Peristaltik, in den übrigen Theilen herrscht Ruhe.
 11^b 20 Vollkommene Ruhe.

Experiment VII.

Junge Katze wie oben behandelt, wird in den Wärmekasten gebracht.

- 12^b 35 Temp. 35,7° C. P. und Cardia in mittlerem Contractionszustande. Ruhe.
 12^b 42 Temp. 36,2° C. Schwache Peristaltik des mittleren Drittels des Mk., PP. und P. ruhig.
 12^b 46 Temp. 36,4. Mittelfurche ausgesprochen. Träge Peristaltik der zwei unteren Drittel. PP. ruhig in mäßigcontrahirtem Zustande.
 12^b 55 Temp. 37,0°. Die Peristaltik deutlich stärker und bemächtigt sich auch der PP.
 12^b 57 Starke Peristaltik mit deutlichen Sphinctercontractionen.
 1^b 5 Temp. 37,5°. Peristaltik schwächer.

- 1^h 8 Die Peristaltik nur ganz oberflächlich und nur im unteren Drittel des Mk. und der PP.
 1^h 14 Vollkommene Ruhe. Der Magen ist ganz schmal, das obere Drittel von oben nach unten abgeplattet und nach oben spitz zulaufend.

Experiment VIII.

Kater wie oben behandelt, wird in den Wärmekasten gebracht.

- 12^h 25 Temp. 37,5°. P. contrahirt. Mk. und PP. ruhig.
 12^h 38 Bildet sich die Mittelfurche.
 12^h 39 Schwache Peristaltik von der Mittelfurche beginnend und die zwei unteren Drittel des Mk. und die PP. einnehmend.
 12^h 47 Deutlich ausgesprochene Mittelfurche. Peristaltik des Mk. stark, in der PP. schwach.
 12^h 49 Peristaltik in den zwei unteren Dritteln stark, mit deutlicher Sphinktercontraction, auch in der PP. stärker, P. ruhig.
 12^h 53 Pylorus spielt.
 12^h 57 Peristaltik des Mk. und der PP. schwächer. Mittelfurche flacht sich ab.
 1^h 1 Mittelfurche verschwunden, kaum wahrnehmbare Peristaltik der zwei unteren Drittel. PP. dilatirt und ruhig.
 1^h 3 Vollkommene Ruhe.

Experiment IX.

Katze wie oben behandelt, wird in den Wärmekasten gebracht.

- 11^h 5 Temp. 36,7. Spiel des P. Mittelfurche deutlich. Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk. und der PP. mit deutlicher Sphinktercontraction. Spiel der Cardia.
 11^h 20 Peristaltik schwächer.
 11^h 23 Die Mittelfurche flacht sich ab.
 11^h 25 Peristaltik wieder stärker. Mittelfurche wird tiefer.
 11^h 27 Das Spiel des P. hat aufgehört.
 11^h 30 Die Peristaltik verliert an Stärke und wird träge.
 11^h 34 Peristaltik wird schwach, Mittelfurche geschwunden.
 11^h 40 Vollkommene Ruhe.

Experiment X.

Kleiner Hund, ebenso wie die Katze oben behandelt, wird in den Wärmekasten gebracht.

- 11^h 13 Temp. 37,2°. P. spielt. Wogende Bewegung im unteren Drittel des Mk. Peristaltik der PP.
 - 10^h 14 Peristaltik des unteren Drittels allein.
 - 10^h 17 Starke Peristaltik der PP.
 - 11^h 20 Aeufserst starke Peristaltik des unteren Drittels und der PP. Die zwei oberen Drittel ruhig; die Mittelfurche undeutlich.
 - 10^h 24 Peristaltik schwächer.
 - 10^h 25 Peristaltik wieder stark.
 - 10^h 30 Spiel des P. hat aufgehört, die PP. zeigt noch kaum wahrnehmbare oberflächliche Wellenbewegungen, die zwei unteren Drittel des Mk. zeigen noch schwache Peristaltik.
 - 10^h 35 PP. und P. ruhig, der Mk. weist noch sehr schwache Peristaltik auf.
 - 10^h 40 Mittelfurche völlig geschwunden.
 - 10^h 45 Vollkommene Ruhe.
-

Vergleiche ich nun die vorliegenden Protocolle mit den Beobachtungen früherer Autoren, so treten erhebliche Unterschiede zu Tage. Den von Schwartz, Haller, Spallanzani, Magendie und Schiff*) angegebenen Typus — Beginn der Welle am Duodenum, antiperistaltisches Fortschreiten derselben bis zur Magenmitte und peristaltisches Zurückkehren zum Pylorus, — habe ich kein einziges Mal beobachten können.

Die letzthin von Hofmeister und Schütz angestellten Untersuchungen stimmen theilweise mit den meinen überein, insofern die Bildung der Mittelfurche, die bereits Schiff angegeben, und die von ihr ausgehende Peristaltik

*) l. c.

von beiden Seiten für constant befunden worden ist. Mit der Angabe dagegen, daß die Peristaltik des Magenkörpers mit Ausbildung der Praeantralfurche ihr Ende erreiche und hieran sich eine mit Zuschnürung des Sphincter antri pylori beginnende Contraction der Pars Pylorica in toto anschliesse, kann ich mich nicht in Uebereinstimmung erklären und somit die von Hofmeister und Schütz gemachte Eintheilung der Magenbewegungen in 2 Phasen nicht zugeben.

In all meinen Experimenten sah ich die Peristaltik des Magenkörpers gleichmäfsig auf die Pars Pylorica übergehen mit etwas deutlicherer Markirung der Sphinctercontraction. Eine Praeantralfurche habe ich nie bemerken können. Die Peristaltik im Magenkörper und der Pars Pylorica können unabhängig von einander auftreten, so daß letztere nicht die nothwendige Folge ersterer zu sein braucht. In einzelnen Fällen sah ich in den zwei unteren Dritteln des Magenkörpers Peristaltik mit Antiperistaltik wechseln, was jedoch stets nur kurze Zeit dauerte und bald wieder der Peristaltik allein Platz machte. Das von Bafslinger*) direct beobachtete und von Openchowski, Knaut und Hlasko graphisch dargestellte Spiel der Cardia habe ich in den meisten Fällen constatiren können.

Wie aus den Protocollen ersichtlich, führt auch der Pylorus spontane Bewegungen aus, wie sie auch schon von Dobbert graphisch dargestellt worden sind. Der Einwand also, den man vielleicht der graphischen Methode machen könnte, daß dieses Spiel der Cardia und des Pylorus durch den Reiz des in dieselben eingeführten Bläschens hervorgerufen sei, wäre hiermit widerlegt. Wer ausserdem gesehen, mit welcher Menge fester Substanzen der Kaninchen-

*) l. c.

und Hundemagen zuweilen vollgepfropft sind, der wird in praxi die Nichtigkeit des Einwandes einsehen.

Fasse ich alles noch einmal zusammen, so ergiebt sich für Katzen und Hunde folgender Typus der normalen Magenbewegungen:

An der Grenze zwischen dem mittleren und oberen Drittel des Magenkörpers (zuweilen auch etwas tiefer) bildet sich eine Mittelfurche, die solange vorhält, als der Magen seine Bewegungen ausführt. Von ihr nimmt eine peristaltische Welle ihren Ursprung, welche gleichmäfsig auf die Pars Pylorica übergeht und nur am Sphincter Antri Pylori deutlicher markirt erscheint. Der cardiale Theil des Magens (oberes Drittel) weist keine Peristaltik auf. Cardia und Pylorus zeigen spontanes Spiel.

Zum Schlusse dieses Capitels möchte ich noch zwei Protocolle hinzufügen, welche meine Beobachtungen der Magenbewegungen nach künstlich hervorgerufener Anämie enthalten. Letztere wurde durch Abklemmen der Aorta in der Brusthöhle hervorgerufen:

Experiment XI.

Ein kleiner 2 Monate alter Hund wird, wie oben erwähnt, behandelt.

11^h 50 Temp. 37,5° C. Mittelfurche deutlich. Peristaltik der 2 unteren Drittel gleichmäfsig auf die PP. fortschreitend. Spiel des P.

12^h 0 Die Peristaltik sehr stark mit deutlicher Sphincter-contraction.

12^h 15 Peristaltik schwächer. Spiel des Pylorus dauert fort.

12^h 20 Anämie.

- 12^h 25 Stärkere Peristaltik der 2 unteren Drittel des Mk.
PP. ruhig.
12^h 30 Die Peristaltik des Mk. sehr stark. Contraction der
PP. in toto.
12^h 32 Starkes Spiel der Cardia. Contraction der PP. in toto.
12^h 35 Die Peristaltik des Mk. schwächer. Die Contraktionen
der PP. feltener.
12^h 40 Ruhe.
1^h 0 Ruhe.

Experiment XII.

Eine Katze wie oben behandelt. Temp. 37,2° C.

- 11^h 0 Der Magen macht nur kaum wahrnehmbare Bewe-
gungen.
11^h 10 Mittelfurche deutlich. Peristaltik der 2 unteren Drittel
des Mk., P. und PP. ruhig.
11^h 20 Anämie.
11^h 24 Starke Contraction des P.
11^h 25 Schwache Contraction der PP. in toto.
11^h 27 Die Mittelfurche vertieft. Starke Peristaltik der 2
unteren Drittel des Mk. PP. ruhig, P. spielt.
11^h 30 Starke mehrmalige Contraction der PP. in toto.
11^h 32 Die Peristaltik schwächer.
11^h 34 Die Peristaltik kaum wahrnehmbar. PP. contrahirt
sich noch ab und zu.
11^h 35 Ruhe.
12^h 0 Ruhe.

Aus diesen Protocollen geht hervor, daß ich mich in Bezug auf die Fehlerquellen der Methode Hofmeister-Schütz nicht getäuscht habe, da der von genannten Autoren als normal bezeichnete Typus der Magenbewegungen mit demjenigen übereinstimmt, den ich nach künstlicher Anämie beobachtet habe.

Mit den gemachten Erfahrungen schritt ich zu weiteren Untersuchungen.

Capitel II.

Die Bewegungen des Magens unter der Einwirkung von Brechmitteln.

Magendie's *) Beobachtung, daß das Thier doch bricht, wenn man ihm den Magen durch eine Schweinsblase ersetzt, ist, wie schon früher erwähnt, von Tautini*) und Schiff*) widerlegt worden. Die Untersuchungen von Knaut²²⁾ haben nachgewiesen, daß Zerstörung der nervösen Bahnen des Magens das Erbrechen unmöglich macht, und nachdem Openchowski nach Extirpation der Magencentra das Ausbleiben des Erbrechens trotz vorhanden gewesener Brechbewegungen constatirte war es evident, daß das Ausbleiben des Erbrechens in diesen Fällen auf eine Störung der Magenthätigkeit zurückzuführen war. Eine Reihe von anderen zu diesem Zwecke von Openchowski**) angestellten Versuchen haben zur Genüge die Betheiligung des Magens am Erbrechen erwiesen. Der Verfasser hatte nämlich schon früher bei Kaninchen und Katzen mittelst der graphischen Methode beobachtet, daß bei künstlicher Anämie der Magen einige Minuten heftige Bewegungen ausführe, dann aber in vollständige Erschlaffung gerathe***). Die Cardia ist breit geöffnet, der ganze Magen stellt eine schlaffe Blase vor. Wird nun einem Thiere, Hund oder Katze, die Aorta auf der Höhe des Zwerchfells unterbunden, so erfüllt der Magen desselben alle Bedingungen des Magendie'schen Versuches. Giebt man nun Apomorphin oder Lobelin, so

*) l. c.

**) Diese Angabe verdanke ich mir freundlichst zur Verfügung gestelltem Manuscripte.

***) Uebereinstimmend mit Exp. XI und XII.

bleiben entweder Brechbewegungen und Erbrechen aus, oder es erfolgen erstere, aber ohne Effect. Letztere Thatfache widerlegt am besten auch den Einwand, daß die Bauchpresse durch den Eingriff (Aortenligatur) paralyfirt worden und das Erbrechen deswegen ausgeblieben sei. In manchen Fällen beobachtete Openchowfki nach Lüftung der Aorta schnell eintretendes Erbrechen, woraus klar hervorgeht, daß die durch Anämie hervorgerufene Paralyse des Magens die Hauptursache für das Nichteintreten des Erbrechens abgab.

Ich stellte einige diesbezügliche Controllversuche an und überzeugte mich, wie aus nachfolgenden Protocollen zu ersehen, von der Richtigkeit der Openchowfki'schen Beobachtung.

Experiment XIII.

- 5^h 0 Eine Katze wird chloroformirt, Aorta per Thoracotomie unterbunden und die Wunde sorgfältig vernäht.
- 5^h 30 Aufwachen aus der Narcofe. Die unteren Extremitäten gelähmt. Milch per Schlundsonde.
- 5^h 40 Das Thier kriecht mühsam vorwärts, die hinteren Extremitäten nachschleifend.
- 6^h 0 Lobelin 0,06 subcutan.
- 8^h 0 Noch kein Erbrechen; das Thier wird getödtet, Section zeigt den Magen mit Milch gefüllt.

Brechbewegungen waren nicht vorhanden gewesen.

Experiment XIV.

- 5^h 3 Ein kleiner Hund wird chloroformirt und die Aorta wie oben unterbunden.
- 5^h 40 Erwachen aus der Narcofe. (Hintere Extremitäten gelähmt, der Hund stöhnt ängstlich.
- 5^h 55 Füllen des Magens mit Milch.
- 6^h 0 Apomorphin 0,002 subcutan.
- 6^h 8 Würgebewegungen ohne Erfolg.
- 6^h 12 Würgebewegungen ohne Erfolg.

8^b 30 Noch kein Erbrechen. Der Hund hatte 22 Brechbewegungen ausgeführt, ohne jeglichen Erfolg. Die Section wies Milch im Magen nach.

Nach Klarstellung dieser Thatfachen trat die Frage an mich heran, welche Art von Bewegungen der Magen ausführen müsse, um das Erbrechen zu Stande zu bringen, und schritt ich daher zur directen Beobachtung der Magenbewegungen unter der Einwirkung von Brechmitteln. Zu Emeticis wählte ich einestheils Apomorphin und Lobelin als centralwirkende, und anderentheils Cuprum als ein reflectorisch durch Reizung des Vagus wirkendes Mittel (Openchowski).

Zu demselben Zwecke hatte Schütz³¹⁾ in Prag Versuche mit Apomorphin an Hunden angestellt und ist zum Resultat gekommen, daß der Magen in seinem pyloren Theile unregelmäßige Contractionen vollführe, die einen wogenden Character haben, und mit zunehmender Ermüdung in die typische Form der von ihm und Hofmeister beschriebenen Peristole umschlagen. Schütz's Beobachtungen leiden auch hier an demselben Fehler, den ich schon oben erwähnt. Er injicirt nämlich dem Thiere Apomorphin, läßt es nach Ablauf von 8—10 Minuten aus der Carotis verbluten und bringt hierauf den ausgeschnittenen Magen in die feuchte Kammer. Es ist nun die Frage, wieviel von den beobachteten Bewegungen dem Apomorphin und wieviel der Anämie zuzuschreiben ist? Daß der anämische Magen kein normaler Magen ist, habe ich schon früher nachgewiesen. Dennoch stimmen einige Schütz'sche Angaben mit denen am normalen Magen beobachteten überein. So stimmen seine Resultate in Bezug auf den Antagonismus des Muscarin und Atropin mit denen von Openchowski*) schon früher an der Cardia des normalen Magens erhaltenen.

*) l. c.

Bei Anstellung meiner Beobachtungen verfuhr ich wie es in Cap. I geschildert. Das Emeticum applicirte ich nie früher, als bis in den Bewegungen des Magens völlige Ruhe eingetreten. Da ich diese normalen Bewegungen auch schon in Cap. I beschrieben, so übergehe ich sie in nachfolgenden Experimenten:

a. Versuche mit Apomorphin.

Experiment XV.

Eine Katze wird wie oben behandelt. Magenbewegungen wie in Cap. I. Temperatur $37\frac{1}{2}^{\circ}$.

11^h 35 Ruhe.

11^h 36 Apomorphin 0,025 intravenös.

11^h 36 Antiperistaltische Contraction des Duodenum. Contraction des Pylorus Peristaltik der PP. Tiefe Mittelfurche, das Stück Mk. zwischen ihr und dem Sphincter antri pylori dilatirt. Cardia geöffnet.

11^h 37' 30" Schwindet die Dilatation hinter der Mittelfurche und bildet sich eine Auftreibung des oberen Drittels aus. PP. zeigt äußerst starke Peristaltik. P. in fortwährendem Spiel begriffen.

11^h 38 Das ganze obere Drittel stark aufgetrieben. Der Magenfundus hat sich gehoben. Die zwei unteren Drittel des Mk. und die PP. zeigen äußerst starke Peristaltik.

11^h 38' 20" Außerst starke Contraction des P., das obere Drittel ad Maximum dilatirt. Mittelfurche sehr tief. Die zwei unteren Drittel der PP. zeigen fortwährend starke Peristaltik und zwar je tiefer abwärts, umso stärker.

11^h 40 Die Peristaltik wird schwächer.

11^h 41 Peristaltik der PP. sehr schwach.

11^h 43 P. und PP. ruhig, der Mk. zeigt noch schwache Peristaltik.

11^h 55 Vollkommene Ruhe. Die Mittelfurche abgeflacht, der Magen schläft, gegen Berührung sehr empfindlich und reagirt auf eine solche mit einigen Contractionen.

Experiment XVI.

Ein Kater wie oben behandelt. Magenbewegungen wie früher beschrieben. Temperatur 37,3.

12^h 45 Ruhe.

12^h 49 Apomorphin 0,025.

12^h 49' 10" Starke antiperistaltische Contraction des Duodenum, der sofort eine solche des P. folgt.

12^h 50 Peristaltik der PP. Cardia geöffnet.

12^h 52 Mittelfurche. Peristaltik der zwei unteren Drittel des MK. und der PP., die beim Absteigen an Intensität zunimmt.

12^h 55 Das obere Drittel aufgetrieben, die zwei unteren verschmälert.

12^h 58 Die Peristaltik äußerst stark. P. spielt fortwährend, dazwischen Antiperistaltik des Duodenum.

1^h 3 Wird die Peristaltik schwächer, namentlich in der PP.

1^h 6 Pylorus ruhig, PP. und Mk. zeigen noch schwache Peristaltik.

1^h 15 Völlige Ruhe

Experiment XVII.

Ein kleiner 3 Monate alter Hund wie oben behandelt. Normale Magenbewegungen sehr intensiv. Temp. 37,8 ° C.

10^h 56 Ruhe.

10^h 59 Apomorphin 0,002.

10^h 39' 10" Starke Peristaltik des unteren Drittels und der PP. Contraction des P. Deutliche Mittelfurche.

11^h 0 Sehr starke Auftreibung des oberen Drittels, äußerst starke Peristaltik der beiden unteren und der PP. Der Fundus hat sich gehoben.

11^h 2 Die Peristaltik abgeschwächt, das obere Drittel abgeflacht.

11^h 5 Die Mittelfurche verschwunden, die Peristaltik nur im unteren Drittel und in der PP.

11^h 6 Antiperistaltik der zwei unteren Drittel und der PP.

11^h 7 Antiperistaltik in schwache Peristaltik umgeschlagen.

11^h 14 Die Peristaltik stärker; beginnende Auftreibung des oberen Drittels. Mittelfurche deutlich.

11^h 17 Die Peristaltik sehr stark; starke Auftreibung des oberen Drittels die 2 unteren verschmälert.

11^h 23 Das obere Drittel flacht sich wieder ab, die Peristaltik schwächer.

- 11^h 28 Die Peristaltik nur noch im Mk. vorhanden. P. und PP. ruhig.
 11^h 39 Ruhe.

Experiment XVIII.

Ein kleiner 3 Monate alter Hund, dem vorher das Rückenmark entsprechend dem vierten Brustwirbel durchtrennt worden, wird wie oben behandelt.

- 12^b 40 Der Magen macht im unteren Drittel starke Peristaltik. PP. ruhig. P. in Mitteltonus.
 12^b 45 Antiperistaltik am Sphincter antri pylori beginnend und bis zur Mittelfurche fortschreitend.
 12^b 47 Antiperistaltik hat aufgehört, schwache Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk. P. contrahirt.
 12^b 49 Ruhe.
 12^h 56 Apomorphin 0,002 intravenös.
 12^h 58 Schwache Peristaltik der zwei unteren Drittel und der PP. Pylorus ruhig.
 1^h 0 Starke Bewegungen in den Gedärmen.
 1^h 4 Schwache Antiperistaltik des Mk. PP. ruhig.
 1^h 6 Ruhe.
 1^h 8 Schwache Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk. PP. ruhig.
 1^h 11 Die Peristaltik des Mk. sehr schwach.
 1^h 13 Das untere Drittel zeigt sehr schwache Antiperistaltik.
 1^h 18 Ziemlich starke Peristaltik von dem unteren Theile des oberen Drittels beginnend und im Fortschreiten nach unten bedeutend schwächer werdend. PP. ruhig.
 1^h 20 Starke Peristaltik des unteren Drittels der PP. und des Duodenum.
 1^h 21 Ruhe.
 1^h 25 Starke Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk., der PP. und des Duodenum.
 1^h 35 Peristaltik des Mk. sistirt. Starke fortwährende Peristaltik des Duodenum.
 1^h 38 Ruhe.

b. Versuche mit Lobelin:

Experiment XIX.

Eine Katze wie oben behandelt. Normale Magenbewegungen wie in Cap. I.

11^h 43 Ruhe.

11^h 47 Lobelinum fulfuric. 0,06 intravenös.

11^h 48 Sehr starke Peristaltik des unteren Drittels des Mk. und der PP. mit deutlicher Sphinctercontraction. Contraction des P. Starke Bewegung in den Gedärmen. Cardia geöffnet.

11^h 50 Die Peristaltik ergreift auch das mittlere Drittel; das obere Drittel ruhig und dilatirt.

11^h 52 Die Peristaltik der PP. sistirt und ist nur schwach im unteren Drittel des Mk.

11^h 55 Wieder starke Peristaltik des unteren Drittels der PP. mit starken Pyloruscontractionen.

11^h 58 Die Peristaltik sehr abgeschwächt.

12^h 10 Ruhe.

Experiment XX.

Eine Katze wie oben behandelt. Normale Magenbewegungen, zeigen keine Abweichungen.

1^h 3 Ruhe.

1^h 10 Lobelin 0,06 intravenös.

1^h 11 Bewegung in den Gedärmen Im mittleren Drittel bildet sich eine Auftreibung, die cardialwärts fortschreitet. Deutliche Mittelfurche.

1^h 12 Aeufserst starke Peristaltik der zwei unteren Drittel, des Mk. und der PP. (hauptsächlich im unteren Drittel), das obere erscheint aufgetrieben.

1^h 13 Mehrfache starke Contraction des P. Antiperistaltik des Duodenum.

11^h 17 Die Auftreibung des oberen Drittels stark ausgeprägt.

11^h 23 Sehr starke Peristaltik der zwei unteren Drittel während dieselbe in der PP. nachläßt.

11^h 26 Antiperistaltik des Duodenum, die zwei unteren Drittel erscheinen deutlich verschmälert.

11^h 37 Die Peristaltik wird schwächer.

11^h 40 Peristaltik ganz oberflächlich.

11^h 45 P. und PP. erschlafft, die Mittelfurche abgeflacht, die obere Auftreibung im Schwinden.

11^h 50 Ganz schwache Peristaltik der PP.

11^h 58 Ruhe: die obere Aufreibung geschwunden, die zwei unteren Drittel erschlafft.

Experiment XXI.

Eine Katze, der vorher das Rückenmark entsprechend dem vierten Brustwirbel durchtrennt worden, wird wie oben behandelt.

10^h 40 Ruhe in den Magenbewegungen.

10^h 46 Lobelin 0,06 intravenös

10^h 47 Deutliche Mittelfurche, von der aus schwache Peristaltik beginnt und bis zum antrum fortschreitet; PP. und P. ruhig.

10^h 50 Peristaltik des Mk. wird etwas stärker und nimmt auch die PP. in sehr schwacher Weise an ihr Theil. Der P. contrahirt sich ab und zu sehr schwach.

10^h 55 Peristaltische Contraction des Duodenum, die Peristaltik der zwei unteren Drittel stärker, die der PP. dagegen kaum wahrnehmbar, sie selbst erscheint dilatirt.

11^h 5 Die Peristaltik bedeutend schwächer.

11^h 8 Die Peristaltik ganz schwach und nur auf das untere Drittel beschränkt. Mittelfurche abgeflacht.

11^h 12 Ruhe; der ganze Magen schmal geworden, namentlich in seinem oberen Theil.

Experiment XXII.

Katze mit entsprechend dem vierten Br.W. durchtrenntem RM. wird wie oben behandelt.

12^h 25 Ruhe in den Magenbewegungen.

12^h 30 Lobelin 0,06 intravenös.

12^h 35 Starke Bewegung in den Gedärmen.

12^h 37 Schwache oberflächliche Peristaltik der PP.

22^h 28 Peristaltik auch des unteren Drittels. P. ruhig, der ganze Magen erscheint schmal. Nach Füllung desselben nimmt er innerhalb zweier Minuten wieder die schmale Form an.

12^h 40 Peristaltisches Spiel des Duodenum.

12^h 44 Die Peristaltik des Mk. sehr schwach. Das Duodenum zeigt fortwährende Peristaltik. Sehr starke Bewegungen in den Gedärmen. Die PP. dilatirt und zeigt

nur ganz oberflächliche Peristaltik, während die Peristaltik in den zwei unteren Dritteln des Mk. sehr stark ist.

- 12^h 56 Hat der Magen eine eigenthümliche Gestalt angenommen, indem er nach oben spitz zuläuft, nach unten dagegen sich verbreitert.
 11^h 58 Die Peristaltik des Magens äußerst schwach, nur das Duodenum zeigt dieselbe in stärkerem Mafse.
 12^h 15 Vollkommene Ruhe.

Die angeführten Protocolle geben uns klaren Aufschluss über die Art und Weise der Betheiligung des Magens an dem, durch central wirkende Emetica hervorgerufenen Erbrechen. Es geht aus ihnen hervor, daß der Magen stets ganz bestimmte Bewegungen ausführen muß, die ihm eine bestimmte Form verleihen, welche zum Zustandekommen des Erbrechens augenscheinlich erforderlich ist.

Die beginnende Wirkung des Emeticum äußert sich zuerst in den Gedärmen, welche in starke Unruhe gerathen. Hieran schließt sich gewöhnlich eine starke Contraction des Pylorus, der eine Peristaltik der Pars Pylorica und des unteren Drittels des Magenkörpers folgt. Allmählich wird auch das mittlere Drittel von ihr ergriffen und bildet sich gleichfalls die Mittelfurche, welche letztere zuweilen auch schon vor Beginn der Peristaltik des MK. zur Ausbildung kommt. Die Contractionen des Pylorus nehmen bei sich entwickelnder Wirkung des Brechmittels immerfort an Häufigkeit und Intensität zu, und treten dabei nie erhebliche Dilatationen desselben auf.

Die Peristaltik, in ihrem Ursprung schwach, nimmt beim Fortschreiten gegen den Pylorus hin progressiv an Intensität zu und ist am stärksten in der PP. Das obere Drittel des MK. weist niemals Wellenbewegung auf, sondern beschränkt sich in seiner Thätigkeit nur auf eine Dilatation. Ich sage

abſichtlich Thätigkeit, da dieſer Act keineswegs paſſiv, allein durch die ſtarke Periftaltik erfolgt, welche den Inhalt aus den unteren Theilen des Magens in den oberen treibt. Schon Budge*) hat ſeiner Zeit auf eine active Ausdehnung des Magens hingewieſen, fand aber damals keinen Anklang. Ich hatte nun bei meinen Unterſuchungen einige Male die Gelegenheit zu beobachten, daß ſich die Dilatation des oberen Magendrittels einſtellte, ehe die Periftaltik an den unteren Theilen begann. Ferner ſprach auch dafür ein ſpäter anzuſührendes Experiment, in welchem ich die zwei unteren Drittel des MK. durch eine feſte Ligatur außer Communication mit dem oberen ſetzte und die Dilatation des letzteren trotzdem eintrat, ohne daß Schluckbewegungen erfolgt waren, bedingt durch etwaiges Verſchlucken von Speichel und Luft (Magendie). Es iſt daher der Grund für dieſe Dilatation in einem Nachlaſſen des Tonus der Muſculatur zu ſuchen.

Ich möchte hier bemerken, daß die von Hlaſko graphiſch von den Magenwandungen unter Apomorphin dargeſtellte Curve ſich nur auf die 2 unteren Drittel des MK. beziehen kann.

Die Periftaltik ſpielt eine weſentliche Rolle beim Befördern des Inhaltes in den aufgetriebenen Theil. Ich ſtelle mir die Wirkung derſelben wie folgt vor: Der Pylorus bildet durch ſeine Contractionen einen feſten Verſchluß zum Duodenum hin. Die Periftaltik erfolgt nun wie beſchrieben derart, daß ſie ſchwach beginnt, immer ſtärker wird und ihre größte Kraft zu Ende entwickelt. Dadurch iſt der Mageninhalt, da ihm der Weg zum Duodenum verſperrt iſt, gezwungen, den rückläufigen Weg einzuschlagen und in den oberen aufgetriebenen Theil des Magens zu gelangen.

*) l. c

Zur deutlicheren Vergegenwärtigung des Gefagten fülle man einen Gummiballon zum Theil mit Wasser und übe auf denselben mit zwei Fingern einen Druck aus, der entsprechend der Peristaltik oben schwach beginnt, nach unten zu stärker wird und man wird sehen, daß die Flüssigkeitsäule in die Höhe steigt.

Die in den Protocollen angeführte von Zeit zu Zeit erfolgende Antiperistaltik des Duodenum giebt uns, falls sie mit einer Pylorusöffnung coincidirt, eine Erklärung für das Eintreten der Galle in den Magen beim Erbrechen.

Was nun die Form des Magens anbetrifft, die er bei vollkommen ausgebildeter Brechwirkung annimmt, so läßt sie sich am besten mit einer Birne vergleichen (Fig. IX B), indem das obere Magendrittel dem unteren breiten Theile, die beiden unteren Drittel und die PP. dem schmalen Stieltheile entsprechen. Es ist evident, daß bei solcher Form des Magens die Bauchpresse im Stande ist einen kräftigen Druck auf die aufgetriebene pars cardiaca auszuüben, während sie auf einen schlaffen Magen ihre Wirkung nicht entfalten kann.

Daß die soeben geschilderten Bewegungen und die Form des Magens typisch für den Brechact sind, geht aus Experiment XXI und XXII hervor, in welchen den Versuchsthieren das RM. entsprechend dem IV. Brustwirbel durchtrennt und somit die Bahnen für's Erbrechen zerstört worden waren. Die Bewegungen erfolgten hier alle schwach, nur in Versuch XVIII erfolgten sie stärker, aber auch erst nach Ablauf von 22 Minuten, was entschieden nicht mehr auf Apomorphinwirkung zu beziehen ist, da diese sich schon nach 4 Minuten durch Bewegung in den Gedärmen documentirte.

Was die Form des Magens anbetrifft, so war sie hier auch eine ganz andere: Zu einer Auftreibung des oberen

Drittels kam es nicht, im Gegentheil, der Magen lief nach oben spitz zu und erschien im unteren Theile breiter.

Bemerkenswerth ist auch, daß die Antiperistaltik des Duodenum fehlte und dieses äußerst häufige und starke Peristaltik aufwies.

c. Versuche mit Cuprum,

Experiment XXIII.

Eine Katze wie oben behandelt. Magenbewegung wie in Cap. I.

- 11^b 7 Ruhe.
- 11^b 8 Cuprum sulfuric. 25 % 5 Ccm. mit Wasser verdünnt per Schlundsonde *).
- 11^b 11 Starke mehrmalige Contraction des Duodenum und des P.
- 11^a 15 Duodenum ruhig. Das obere Drittel des Mk dilatirt sich.
- 11^b 25 Schwache Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk. die PP. ruhig. P. contrahirt.
- 11^b 27 Hat die Peristaltik aufgehört, das obere Drittel treibt sich stärker auf
- 11^b 30 Die Auftreibung des oberen Drittels wird immer stärker, die zwei unteren Drittel verengen sich.
- 11^b 35 Cardia geöffnet. Die Auftreibung äußerst stark
- 11^b 27 Ist die Auftreibung nach unten durch eine tiefe Mittelfurche begrenzt; die zwei unteren Drittel zeigen rege Peristaltik.
- 11^b 42 Die obere Auftreibung flacht sich ab.
- 11^b 44 Das obere Drittel wird aufgetrieben.
- 11^b 48 Die Peristaltik sehr schwach, das obere Drittel flacht sich ab.
- 11^b 55 Vollkommene Ruhe. Die Mittelfurche und die obere Auftreibung geschwunden.

Experiment XXIV.

Kater wie oben behandelt.

- 5^b 7 Ruhe in den Magenbewegungen. Cuprum 5 Ccm. per Sonde.

*) Nach dieser Dosis brechen die Thiere heftig, erholen sich aber nach 24 Stunden.

- 5^h 15 Ganz schwache Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk.
- 5^h 17 Tiefe Mittelfurche, sehr starke Peristaltik der zwei unteren Drittel des Mk mit deutlicher Sphinctercontraction auf PP. übergehend und mit Contraction des P. schliessend. Das Duodenum zeigt mehrmalige Antiperistaltik.
- 5^h 20 Die Mittelfurche hat sich abgeflacht; die Peristaltik in den zwei unteren Dritteln noch stärker.
- 5^h 23 Aeussert starke Peristaltik der PP.
- 5^h 27 Die Mittelfurche ganz leicht, trennt das mittlere aufgetriebene Drittel vom oberen, das gleichfalls stark dilatirt erscheint. Bis auf PP. und P., die noch in Bewegung, herrscht Ruhe.
- 5^h 35 Die Peristaltik des Mk wieder sehr stark, erstreckt sich auf den unteren Theil des oberen Drittels. PP. zeigt nur schwache Bewegung.
- 5^h 40 Die Peristaltik nimmt auch das ganze obere Drittel ein, das äusserst stark aufgetrieben erscheint.
- 5^h 41 Das obere Drittel etwas flacher geworden. Sehr starke Auftreibung des oberen Drittels, in den zwei unteren Peristaltik bis zum Sphincter, PP. und P. ruhig.
- 5^h 50 Die Peristaltik wird schwach, die Auftreibung schwindet.
- 6^h 3 Vollkommene Ruhe, der Magen in all seinen Theilen schlaff.

Experiment XXV.

Einer Katze, die wie oben behandelt, werden die Vagi durchtrennt.

- II^h 18 Ruhe in den Magenbewegungen. Schwache Mittelfurche.
- II^h 20 Cuprum 25 CCm. per Schlundsonde.
- II^h 25 Die beiden unteren Drittel des Mk. zeigen sehr schwache Peristaltik, die sich beim Sphincter antri pylori verliert, indem sie beim Fortschreiten immer schwächer wird. PP. völlig ruhig und dilatirt.
- II^h 30 Die Mittelfurche schwindet, die beiden unteren Drittel zeigen nur noch schwache Peristaltik. PP. ruhig und dilatirt, der P. erscheint gegen früher etwas erweitert. Das obere Drittel sehr stark verschmälert.
- II^h 40 Vollkommene Ruhe. Der ganze Magen in allen Theilen von gleichem Durchmesser, zweifingerbreit, von wurfförmiger Gestalt.
- II^h 50 Wird das Thier getödtet.

Experiment XXVI.

Einer Katze werden die Vagi durchtrennt.

- 1^h 14 Ruhe in den Magenbewegungen. Deutliche Mittelfurche; der Magen schmal, spitz nach oben zulaufend.
 1^h 18 Cuprum per Schlundsonde.
 1^h 30 Peristaltik des Duodenum, starke Bewegung in den Gedärmen. Der Magen verhält sich ruhig.
 1^h 40 Pylorus erscheint dilatirt. Mittelfurche geschwunden.
 1^h 45 Wird das Thier getödtet.

Der Magen hatte während der ganzen Zeit der Versuchsdauer keine Bewegungen gezeigt und hat im Ganzen dieselbe Form beibehalten, wie vor Darreichung des Kupfers.

Aus diesen Protocollen ist ersichtlich, daß die Form des Magens unter Einwirkung des Kupfers, der durch Apomorphin und Lobelin hervorgerufenen gleichkommt, nur glaube ich bemerkt zu haben, daß sie nicht so ausgeprägt zu Tage tritt wie bei den ersteren.

In Bezug auf die Magenbewegungen ist wohl ein Unterschied zu constatiren. Unter Apomorphin und Lobelin verhält sich das obere Drittel des Mk. abgesehen von seiner Dilatation, ruhig. Unter Cuprum dagegen sieht man es gleichfalls peristaltische Bewegungen ausführen, was einen nicht wundern darf, wenn man bedenkt, daß Cuprum von der Magenschleimhaut aus wirkt und somit auch den oberen Theil des Magens in Reizzustand versetzt.

Nach Durchtrennung der Vagi sah ich stets die Aufreibung des oberen Drittels ausbleiben und die Bewegungen sehr schwach vor sich gehen.

Nachdem constatirt worden, daß Pylorus und Pars Pylorica eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des Magens zum Erbrechen spielen, habe ich mich auch über die

Abhängigkeit dieser Theile vom Gehirn orientiren wollen, was in Capitel III zusammengefasst ist. Vermittelt der selben graphischen Methode die ich dazu benutzte, wurde auch die Wirkung von Apomorphin auf den Pylorus studirt und ich glaube es ist hier die geeignete Stelle dieser Untersuchungen Erwähnung zu thun.

Experiment XXVII.

Ein kleiner Hund wird curarisiert, ihm ein Bläschen in den Pylorus gebracht, dasselbe mit Wasser gefüllt und mit der Marrey'schen Lufttrommel in Verbindung gebracht (cf. Dobbert). Der Pylorus macht kleine spontane Bewegungen.

4^h 38 Das spontane Spiel des P. hat aufgehört.

4^h 49 Apomorphin 0,002 intravenös.

5^h 0 Starke Contraction des P., der mehrere von derselben Intensität folgen.

5^h 3 Werden die Contractionen kleiner.

5^h 10 Ruhe.

5^h 15 Zweite Gruppe von Contractionen, jedoch von geringerem Umfange.

5^h 25 Ruhe.

5^h 27 Apomorphin 0,002.

5^h 27' 30" Gruppe von Contractionen.

5^h 31 Ruhe.

Experiment XXVIII.

Einem kleinen Hunde wird das RM. entsprechend dem IV. Brustwirbel freigelegt, worauf er wie oben behandelt.

4^h 25 Apomorphin 0,002 intravenös.

4^h 25' 10" Gruppe von Contractionen.

4^h 28 Pause.

4^h 29 Zweite Gruppe von Contractionen von geringerem Umfange.

4^h 30 Ruhe. Durchtrennung des RM.

4^h 38 0,002 Apomorphin — kein Erfolg.

4^h 46 0,002 Apomorphin — kein Erfolg.

4^h 54 0,002 Apomorphin — kein Erfolg.

Diese Versuche zeigen, daß Apomorphin durch Vermittelung des R.M. contrahirend auf den P. wirkt, wobei die Contractionen gruppenweise auftreten, nach geringer Pause sich mit geringerer Intensität wiederholen, um schließlich in Ruhezustand überzugehen. (Fig. VI A). Es ist dies eine Curve vollständig ähnlich der, welche ich durch electriche Reizung der Vierhügelgegend erhalten habe, (vergl. Fig. V und VI A). Durchtrennung des oberen Brustmarkes bis zum VI. Wirbel hebt die Wirkung des Apomorphin auf (Fig. VI B).

Capitel III.

Centrale Innervation des Pylorus.

Nachdem die Arbeiten von *Openchowfki* und *Hlasko*²³⁾ die Existenz der Centra, von denen die Bewegungen der Cardia und der Magenwandungen abhängig sind, nachgewiesen haben und ich den mechanischen Werth des Pylorus und der Pars Pylorica für den Brechact beobachtet, war es aus diesbezüglichen Untersuchungen ersichtlich, daß dieser Theil des Magens vom Centrum aus durch das Emeticum in seine ungewöhnliche Thätigkeit versetzt sein mußte. Nun war es von Interesse die Großhirnverknüpfungen zu studiren. Wie schon erwähnt, sind die peripheren Nervenbahnen für diesen Theil schon von *Ofer**, und *Dobbert**) untersucht worden.

Meinem Zwecke entsprechend, habe ich hier die graphische Methode von *Openchowfki*, wie sie *Hlasko* angewandt, in Anspruch genommen. Zu Versuchsobjecten wählte ich gleichfalls Hunde.

Die Vorbereitung des Thieres, Oeffnung des Schädels, Stillung der Blutung etc. war dieselbe wie bei *Hlasko*.

*) l. c

Einführung der Blase in die PP. und durch den P. in's Duodenum, habe ich wie mein Vorgänger **D o b b e r t** ausgeführt. Die Temperatur des Thieres wurde durch einen **K r o n e c k e r**'schen Wärmeapparat auf $37-38^{\circ}\text{C}$ constant erhalten.

Als Reiz benutzte auch ich den inducirten Strom des **Du-Bois-Reymond**'schen Apparates mit Unterbrecher von bestimmter Frequenz, wie er schon in obigen Arbeiten zur Genüge beschrieben worden.

Ich richtete mein Augenmerk darauf, bei all meinen Reizversuchen mit möglichst schwachen Strömen zu arbeiten und womöglich bei der Stromstärke zu verweilen, welche den ersten Effect hervorgerufen.

Experiment XXIX.

Einem mittelgroßen Hunde wird die linke Hemisphäre freigelegt und die Hirnoberfläche mit den Electroden abgetastet Temp. $37,5^{\circ}\text{C}$. Vom sulc. cruciat. deutliche präcise auf den Reiz reagirende Contraction des P. Wiederholt 6 Mal. R.-A.*) 12 Fr. 22.

Aus diesem Protocolle geht hervor, daß dieselbe Stelle der Gehirnoberfläche, welche auf die Cardia öffnend wirkt, Contraction des P. hervorruft. Ich habe zum Vergleich eine Curve der Cardia hinzugefügt, die mir der geehrte College **Hlasko** zur Verfügung gestellt und die in seiner Arbeit keine Aufnahme gefunden. (Fig. I).

Experiment XXX.

Vorbereitung eines kleinen Hundes wie oben Geringe Blutung bei Eröffnung des Schädels Temp. 38° . Gleichzeitiges Schreiben des P. und der Cardia. Spontane Bewegungen des P. Cardia ruhig. Reizung der Hirnoberfläche ohne Effect. Tiefere Reizung in der Gegend der Thalami ohne Effect. Die Electroden werden unter sulc. cruciat. tief eingestochen. Kein Effect. Bei noch tieferem Einstechen

*) R.A. = Rollenabstand. Fr. = Frequenz.

und Oeffnen des Stromes colossale Oeffnung der Cardia und gleichzeitige Hemmung der spontanen Bewegungen des P. R.-A. 12. Fr. 22. Wiederholt 7 Mal. (Fig. II).

Section. Die Electroden fassen in der Verbindungsstelle des nucl. caudat. mit dem nucl. lentiformis. Dieser Versuch lehrt uns, dass vom dilatatorischen Centrum der Cardia auch Hemmungen für den P. zu erzielen sind.

Bei Reizung der Vierhügelgegend erhält man zweierlei Curven, eine vom Pylorus selbst, die andere von der Pars Pylorica. Die dem P. entsprechende ist spitz, fällt während des Reizes steil ab und steigt bei Schluss des Stromes ebenso steil auf (Fig. III). Die Curve der PP. stellt uns eine länger ausgezogene, wellenförmige Linie dar, wie sie dem Verlauf der Peristaltik der PP. entspricht. (Fig. IV).

Experiment XXXI.

Einer kleinen Hündin wird die linke Hemisphäre freigelegt und bis auf die Vierhügel abgetragen. Ziemlich starke Blutung. Temperatur 37,5. Kleine spontane Bewegungen des P. Directe Reizung der Vierhügel ruft eine ganze Gruppe von Contractionen hervor (Fig. V) RA. 11 Fr. 40.

Section: Die Electroden fassen in der Tiefe der Vierhügel.

Wie aus dem Protocoll zu ersehen, erhält man also bei Reizung der Vierhügel nicht nur eine gefonderte Contraction, sondern auch eine Gruppe von Contractionen; ich mache darauf aufmerksam, dass diese Gruppe ähnlich ist derjenigen, welche wir durch Apomorphin hervorgerufen haben, wie schon im Cap. II erwähnt. Dieser Umstand ist von grossem Interesse, wenn man bedenkt, dass Openchowski nach Extirpation der Vierhügelgegend durch Apomorphin kein Erbrechen mehr hervorrufen konnte [citirt nach Manuscript].

Experiment XXXII.

Einem kleinen Hunde wird die linke Hemisphäre freigelegt, wobei geringe Blutung. Abtragung derselben bis zum cornu Ammonis. Starke Blutung. Temp. $37,3^{\circ}$. Die Electroden werden schräg nach hinten durch das Ammonshorn eingestochen. Bei Stromöffnung schwache, allmählich eintretende Contraction; nach Schließung des Stromes allmähliches Ansteigen der Curve über die Abscisse (Fig. VII) RA. 11 Fr. 22. Wiederholung 5 Mal.

Section wies nach, daß die Electroden in der Haube rechterseits fassen.

Bei Betrachtung der hierzu gehörigen Curve, sehen wir, daß nach einer wellenförmig ausgezogenen, abfallenden Linie während des Reizes, eine große Oeffnung nach Unterbrechung desselben stattfand. Es ist klar, daß diese Curve nach oben Gefagtem nur auf die PP. zu beziehen ist, und daß an dieser Stelle nicht nur contrahirende, sondern auch hemmende Fasern durch den Reiz getroffen worden sind, indem anfangs die contrahirenden das Uebergewicht hatten und erst nach Schluß des Stromes die Wirkung der ihrer Banden entledigten hemmenden deutlich zu Tage trat.

Experiment XXXIII.

Einem kleinen Hunde wird die linke Hemisphäre freigelegt und theilweise abgetragen. Blutung gering. Temp. $37,9^{\circ}$ C. Pylorus macht spontane Bewegungen. Reizung der Kleinhirnoberfläche ohne Effect. Bei tieferem Einstechen der Electroden bei jeder Oeffnung des Stromes eine Hemmung der spontanen Bewegungen während der Reizdauer. RA. 9 Fr. 22. Wiederholung 4 Mal (Fig. VIII).

Section weist nach, daß die Electroden spitzen unter der Olive in der rechten Seite der Medulla fassen.

Dieses Experiment beweist, daß die hemmende Fasern für den P. in die Medulla ausstrahlen. Bemerkenswerth ist, daß ich in diesem Falle mit bedeutender Stromstärke gearbeitet, und trotzdem keine Contractionen durch Uebertra-

gung des Reizes auf die Vaguskerne erhalten habe, wie es doch zu erwarten war, da nach den Untersuchungen von Ofer*) und Dobbert*) der größte Theil der contrahirenden Fasern für den P. durch den Vagus verläuft. Es scheint also, daß beim Hunde in der Medulla die vom RM. ausstrahlenden hemmenden Fasern schon stark vertreten sind.

Von meinen 35 Experimenten habe ich hier nur 5 angeführt, welche uns die unstreitbaren Beweise quoad facta geliefert haben. Angabe von noch einigen mit gleichen Resultaten wäre nur Wiederholung gewesen.

Wir sehen aus all diesen Beobachtungen, daß im Gehirn ein gewisser Contrast zwischen der Innervation des Pylorus und der Cardia existirt, wie wir ihn auch peripher nachzuweisen im Stande waren.

Diesen Contrast haben wir vom *fulc. cruciat.* bis zur Medulla verfolgen können, am prägnantesten jedoch ist er im *sulc. cruciat.* selbst ausgesprochen. In den Vierhügeln haben wir Hemmungen für den Pylorus gefunden, wogegen Hlasko für die Cardia nur contrahirende Wirkung von derselben Stelle erzielte.

Von der Medulla obl. sind Oeffnungen der Cardia nur mit schwachen Strömen erreicht worden, derselbe Effect für den Pylorus wurde durch starke Ströme erzielt, deren Intensität auf die Cardia schon längst contrahirend wirkt [Hlasko Exp. XII, XIII, XIV].

Das dilatatorische Centrum der Cardia ist auch mit Hemmung für den P. verknüpft.

Obgleich ich dieses Capitel „centrale Innervation des P.“ betitelt, sieht man aus dem Angeführten, daß wir uns über bestimmte Centra für den P. nicht näher aussprechen

*) l. c.

können. Vielleicht dem *sulcus cruciatus* könnte man diese Bedeutung zuschreiben, da sich von hier ein contrahirender Effect mit schwachen Strömen am deutlichsten hervorrufen läßt. Ob die übrigen Befunde nur eine Bahn vorstellen, darüber müssen weitere genaue Untersuchungen entscheiden. Ich neige wohl zu dieser Ansicht, konnte aber leider diese schwierigen und zeitraubenden Untersuchungen nicht weiter ausführen, indem mir durch die gefundenen Thatfachen die hier einschlagenden Erscheinungen genügend erklärt zu sein scheinen.

Wir halten uns nach dem Auseinandergesetzten für berechtigt zu glauben, die entgeltigen Beweise dafür geliefert zu haben, daß der Magen sich beim Erbrechen activ verhalte, indem zwei Theile desselben sich in entgegengesetztem Sinne zum Act des Erbrechens vorbereiten, — Pylorus Pars Pylorica und die zwei unteren Drittel des Mk. einerseits, das obere Drittel anderseits. — Interessant war es nun zu erfahren, inwieweit diese Theile unabhängig von einander wirken und wieweit sie sich gegenseitig beeinflussen. Zu diesem Zwecke wurden einige Experimente angestellt.

Experiment XXXIV.

Einem kleinen Hunde wird die Bauchhöhle eröffnet, das obere Magendrittel von den beiden unteren durch einen Schnitt abgetrennt und mit Seidenligaturen sorgfältig vernäht. Die Bauchmuskeln werden bei Schluß der Bauchhöhle in eine besondere Nath gefaßt. Nach dem Erwachen aus der Narcofe und Füllen des Magens mit Milch tritt kein Erbrechen ein. Bei Injection von 0,002 Apomorphin — heftiges Erbrechen.

Hieraus ist ersichtlich, daß der cardiale Theil des Magens unabhängig vom unteren Theile desselben seine Function ausüben kann. Es mußte eine Ausdehnung desselben

eingetreten und hiermit eine von den Bedingungen zum Zustandekommen des Erbrechens erfüllt sein. Die zweite Bedingung, das Befördern der Ingesta in den dilatirten Theil, welche Rolle sonst dem unteren Magenabschnitte zufällt, haben wir in diesem Falle durch Eingießen per Schlundsonde erfüllt.

Dafs der cardiale Theil des Magens aber auch von dem unteren Magenabschnitte beeinflusst wird, zeigt uns folgendes Experiment.

Experiment XXXV.

Einem grossen Hunde wird der Magen in seinem unteren Drittel durch eine starke Seidenligatur unterbunden. Da die Ligatur zu niedrig angelegt zu sein schien, wird eine zweite ebenfolche am mittleren Drittel angelegt. Nach dem Erwachen aus der Narcose und Füllung des Magens heftiges Erbrechen. Das Füllen des Magens wird innerhalb einer Stunde mehrmals wiederholt, immer mit demselben Erfolg. Die Bauchhöhle wird eröffnet, wobei sich zeigt, dafs das zwischen beiden Ligaturen befindliche Stück Magen der Gangrän verfallen. Der Magen sehr empfindlich, bei jedesmaliger Berührung des Brandstückes tritt sofort Ausdehnung des oberen Magendrittels ein, ohne dafs Schluckbewegungen erfolgt waren und kurze Zeit darauf heftige Brechbewegungen.

Dieses Experiment demonstirt uns auch sehr schön, dafs die Ausdehnung des cardialen Theils des Magens vor Einwirkung der Bauchpresse zu Stande kommt. Die überaus starke Empfindlichkeit desselben infolge des gangränösen Stückes erklärt auch zur Genüge das pathologische Erbrechen nach Neubildungen, Entzündungen des Magens etc.

Folgendes Experiment zeigt uns wiederum die Beeinflussung des unteren Magenabschnittes durch den cardialen Theil und gewährt uns ausserdem einen Einblick in die Art und Weise, wie dieselbe erfolgt.

Experiment XXXVI.

Einem kleinen Hunde wird der Magen vom kleinen Netz völlig abgetrennt in einer Ausdehnung vom Pylorus bis zum oberen Drittel mit Durchschneidung aller hier verlaufenden Nerven und Gefäße. Letztere werden unterbunden. Nach dem Erwachen aus der Narcofe und Füllung des Magens mit Milch — kein Erbrechen. Bei Injection von 0,002 Apomorphin — reichliches Erbrechen. Die Bauchhöhle wird eröffnet und eine zweite Dose Apomorphin gegeben.

Es erweist sich, daß die Auftreibung des oberen Drittels sehr schön ausgebildet und die zwei unteren Drittel des Mk die PP. und der P. ungestört ihre, ihnen beim Brechact zukommenden Functionen, vollführen.

Da wir nun rechterseits alle Nerven durchtrennt, nach K n a u t²⁾ aber nur die Durchtrennung aller 4 Splanchnici das Erbrechen unmöglich macht, so müssen wir im vorliegenden Falle wahrscheinlich den linken Splanchnicus intact gelassen haben. Der Reiz konnte sich ungestört auf's obere Magendrittel fortpflanzen, auf die unteren und die PP. dagegen nicht. Da nun diese trotzdem ungestört functionirten, so muß eine periphere Uebertragung des Reizes vom oberen auf die unteren Drittel stattgefunden haben und zwar mit entgegengesetzter Wirkung, insofern eine Dilatation des oberen, eine Contraction des unteren Abschnittes hervorgerufen.

Der Bedeutung der Bauchpresse wurde schon im Cap. II Rechnung getragen. Wir fahen, daß sie durch Druck auf den ad Maximum ausgedehnten Theil des Magens, ausleerend auf den Inhalt desselben wirkt, indem diesem durch die starke Peristaltik der Zutritt nach unten unmöglich gemacht wird und die geöffnete Cardia somit der einzige Ausweg bleibt.

Es fragt sich nun ob dies die einzige Kraft ist, welche das in diesem Raum gefammelte Material hinausbefördert?

Wir haben bei directer Beobachtung des Magens brechender Hunde gesehen, daß die Ausdehnung des oberen Magenabschnittes früher eintritt, als die eigentlichen Brechbewegungen, daß diese Ausdehnung nach dem eingetretenen Druck der Bauchpresse sich verkleinert und ad Norm zurückkehrt, um bei erneuerter Wirkung des Brechmittels denselben Vorgang durchzumachen.

Bezüglich dieses Vorganges — Ausdehnung des Magens, Druck der Bauchpresse und Wiedererschaffung des ersteren — erlauben wir uns folgende Hypothese:

Ich stelle mir vor, daß, nachdem die Reizung der hemmenden Fasern des oberen Magendrittels, resp. die Lähmung der den Tonus dieses Abschnittes unterhaltenden Apparate ihren Höhepunkt erreicht, der Magen in seinen früheren Halbtonus zurückzukehren strebt. Dieses Streben kann sich reflectorisch dem contrahirenden Centrum des Magens im Gehirn mittheilen, welches jedoch infolge des durch das Brechmittel gestörten Gleichgewichts in der Innervation, nicht im Stande ist die Dilatation zu überwinden. Der Reiz kann sich nun durch Irradiation auf die nahe gelegenen Bauchpresscentra übertragen, welche sodann in Thätigkeit gerathen. Diese Impulse wiederholen sich rythmisch und so entstehen die Brechbewegungen. Der Druck, welcher dabei von der Bauchpresse auf die stramme Magenwand ausgeübt wird, hilft vielleicht dem Magen durch directen Reiz seiner Wandungen in den contrahirten Zustand zurückzukehren. Diese Contration des Magens fällt immer mit einer Entleerung desselben zusammen, und glauben wir diesem Momente der Verkleinerung auch eine gewisse austreibende Kraft zuschreiben zu können, wiewohl der größere Theil derselben der Bauchpresse zukommt.

Diese Hypothese stützen einige Thatfachen: So hat

Openchowski*) gefunden, daß bei tiefer Zerstörung der Vierhügel nicht einmal Brechbewegungen eintraten, bei weniger ausgiebiger Zerstörung erfolgten diese wohl, das Erbrechen aber blieb aus. In diesem Falle sind wahrscheinlich nur die Magencentra zerstört worden, in ersterem dagegen auch die Centra oder Bahnen für die Bauchpresse.

Meine Beobachtungen unter Apomorphin und Lobelin lehrten mich, daß die Dilatation des oberen Magendrittels bei curarisirten Thieren immer viel länger anhielt, als bei nicht curarisirten. Es machte den Eindruck, als ob der Magen bei den Versuchen im Wärmekasten eines äußern Reizes bedurfte, um aus dem dilatirten in den contrahirten Zustand zurückzukehren.

Die Entleerung des Magens durch eigene Kraft, wird durch einen Versuch von Openchowski (Manuscript) illustriert: Er sah nämlich bei einem Hunde nach beiderseitiger Thoraxöffnung und Durchschneidung der Bauchmuskulatur und des Diaphragma, unter künstlicher Respiration nach Darreichung von Cuprum, sich eine kleine Menge positiv aus dem Magen stammender Flüssigkeit entleeren.

Durch die von mir geschilderten, fürs Erbrechen notwendigen coordinirten Bewegungen des Magens und die gegenseitige Beeinflussung seiner Theile, ließen sich vielleicht auch die Fälle erklären, wo bei erkranktem Magen das Erbrechen fehlt. So ist auch der Fall von Bourdon³²⁾ mit Scirrhus ventriculi verständlich und vielleicht viele andere ähnliche Fälle, bei welchen klinisch festgestellt worden, daß bei vorhandener Neubildung das Erbrechen fehlte. Es han-

*) Citirt nach Manuscript.

delte sich in diesen Fällen vielleicht nicht nur um eine mechanische Störung des afficirten Theiles, sondern übte diese Störung auch auf andere Theile des Magens ihren Einfluß aus.

Noch interessantere Belege liefern uns die Fälle von ausgiebiger Dilatation des Magens. Prof. A. Vogel hat nämlich beobachtet*), daß bei ausgiebiger Dilatation des Magens, durch Apomorphin kein, oder nur sehr schwaches Erbrechen zu erzielen ist. Dies spricht zur Genüge dafür, daß der Magen durch die eingebüßte musculöse Kraft und wahrscheinlich auch durch Veränderung feines Nervenapparates die uns bekannte Thätigkeit nicht entwickeln kann und in Folge dessen das Erbrechen ausbleibt. In widrigem Falle müßte doch die Bauchpresse das Ihrige geleistet haben.

*) Mir von Dr. Openchowski mitgetheilt.

R e f u m é.

1. Die normalen Magenbewegungen erfolgen nach einem ganz bestimmten Typus.
 2. Der Magen nimmt unter der Einwirkung von Brechmitteln eine ganz bestimmte Form an und vollführt Bewegungen gleichfalls von bestimmter Art.
 3. Durchtrennung des oberen Brustmarkes verhindert bei central wirkenden Brechmitteln das Zustandekommen dieser Form und den Eintritt der typischen Bewegungen.
 4. Bei reflectorisch wirkenden Brechmitteln hat Vagusdurchtrennung denselben Effect.
 5. Damit Erbrechen stattfinden, ist eine active Betheiligung des Magens erforderlich.
 6. Der Pylorus wird vom Gehirn aus innervirt.
 7. Zwischen der centralen Innervation der Cardia und der des Pylorus herrscht ein gewisser Contrast.
-

Literatur.

1. Bayle. Diss. physic. sex. Tolos 1677.
2. Chirac. Historie de l'acad. royal etc. sciences 1700.
3. Schwartz, Benjamin. De vomitu et motu intest. Dissert. in Disp. anat. select. Albr. Haller 1746.
4. Haller. Elementa Physiol. VI.
5. Magendie. Mem. sur le vomiss. 1813 Corrifart Journ. XXVIII.
6. Tantini. in Omodei, ann. univ. di pud XXXI 1824.
7. Rühle. Beiträge zur exper. Pathol. und Physiol. von Traube 1846.
8. Budge. Die Lehre vom Erbrechen. Bonn 1840.
9. Schiff, Lec. sur la Physiol. de la digestion 1867.
10. Lüttich. Ueber die Mechanik des Brechacts. Diss. Kiel. Schriften der Univ. Kiel. 1873. Bd. XX.
11. { Braam Houckgus. } Pflügers Archiv 1873. Bd. VI.
 { Sanders. }
12. Magendie. Grundriss der Physiologie, übers. v. Heusinger.
13. Bulatowitz. De part. quas nervi vagi in vomitu agunt Diss. Dorpat 1858.
14. Brachet. Die nervösen Magenkrankh. von B. Stiller. Stuttgart 1884, p. 7.
15. Goltz. Stud. üb. d. Beweg. d. Speiser. u. d. Mag. des Frosches. Pflügers Arch. Bd. VI. 1872.
16. Valentin. Lehrbuch d. Physiol. Bd. I. 1847.
17. J. Müller. Handbuch der Physiol.
18. Oehl. Schmidts Jahrb. 143 Bd.
19. Greve. Stud. über den Brechact. Berl klin. Wochenschr. von Waldenburg. XI. Jahrg. 1874.
20. Openchowski. Centralblatt f. d. med. Wiss. 1883 Nr. 31. Compte rendu du Congrès international des sciences medicales 8. Session. Copenhagen 1884.
21. Rosen. Chem. und pharm. Unters. über Lobelia nicotianoefolia. Diss. Dorpat 1886.
22. Knaut. Innervation d. Mag. seitens des Rückenm. in Hins. auf den Brech. Diss. Dorpat 1886.
23. Oser. Ueber die Innerv. des Pylor. Med. Jahrb. d. K. K. Ges. d. Aerzte zu Wien 1884.
24. Dobbert. Beitr. zur Innerv. des Pylor. Diss. Dorpat 1886.
25. Hlasko. Beitr. z. Bezieh. d. Geh. z. Mag. Diss. Dorpat 1886.
26. Peyer und Wepfer. Handb. d. Phys. von Hermann Bd. V p. 428.
27. Spallanzani. Ueber das Verdauungsgeschäft. Uebers. v. Michaelis. Leipzig 1785 p. 215.
28. Beaumont. Experiments of the gastric. juice. Boston 1834.
29. Basslinger. Rythmische Zusammenziehung an der Cardia. Moleschotts Unt. Bd. VII 1860. p. 359.
30. Hofmeister und Schütz. Ueber die autom. Bew. des Mag. Arch. für exp. Path. und Pharm. XX 1886.
31. Schütz. Ueber die Einwirk. von Arzneist. auf die Magenbew. Arch. für exp. Path. und Pharm. Bd. XXI.
32. Bourdon. Mem. sur le vomiss. Paris 1830.
33. Longet. Traité de Physiol.

THESEN.


1. Die Pars Cardiacae des Magens wird vom Gehirn aus besonders innervirt.
 2. Der dreimalvierundzwanzigstündige Beerdigungstermin ist irrational.
 3. Der Massage sollte auf den Hochschulen größeres Interesse gewidmet werden.
 4. Der stumpfe Haken ist aus dem Register der geburts-hilfflichen Instrumente zu streichen.
 5. Bei acuter Gonorrhoe ist Magisterium Bismuthi im Ver-hältnifs von 16:200 zu versuchen.
 6. Der Sondenbehandlung bei chronischer Gonorrhoe ist eine jedesmalige Injection mit 2% Cocainlösung voraus-zuschicken.
- 

Fig. I. A.




Fig. I. B.



Fig. II.

